

Епидемиолошки подаци


Рак грлића материце је препознат као озбиљан јавноздравствени изазов у Србији. Министарство здравља је зато крајем 2012. године увело организовани скрининг рака грлића материце.

Према подацима Регистра за рак Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, у просеку се у Србији сваке године региструје нешто мање од 1200 новооболелих жена од карцинома грлића материце. Просечна стандардизована стопа инциденције (* стандардна популација Европе) од цервикалног карцинома износи 27,2 на 100.000 жена. Од карцинома грлића материце сваке године умре у просеку 468 жена и просечна стандардизована стопа морталитета (* стандардна популација Европе) износи 9,4 на 100.000 жена свих узраста. Карцином грлића се чешће јавља у узрасту од 35. године, али највише узрастно-специфичне стопе оболевања су у узрасту од 50. до 59. године. У случају умирања регистроване стопе морталитета пропорционално расту почев од 45. године и највише су у узрасту од 70 до 75 и више година.

Током 2019. године регистроване су 1044 новооболеле жене од рака грлића материце и стандардизована стопа инциденције (* стандардна популација Европе) је износила 23,3 на 100.000 жена. Током исте године, 438 жена је у Србији умрло од ове врсте рака и стандардизована стопа морталитета (* стандардна популација Европе) је износила 8,8 на 100.000 жена.


Када говоримо о оболевању, највише стандардизоване стопе инциденције од рака грлића материце у 2019. години, у односу на просечну стопу инциденције од ове малигне локализације у Републици Србији, регистроване су у Борској, Севернобанатској, Западнобачкој и Зајечарској области, а најниже у Севернобачкој, Браничевској, Златиборској и Мачванској области (графикон 1).

Графикон 1. Стандардизоване стопе инциденције рака грлића материце, по окрузима у Републици Србији, 2019. година



У случају леталних исхода, више стандардизоване стопе морталитета од просечне у Републици Србији су регистроване у Борској, Западнобачкој, Колубарској и Севернобанатској области, а најниже у Севернобанатској, Севернобачкој, Златиборској и Зајечарској области (графикон 2).

Графикон 2. Стандардизоване стопе морталитета рака грлића материце, по окрузима у Републици Србији, 2019. година



На основу регистрованих стопа оболевања и умирања, као и на основу најновијих процена Европског информационог система (ECIS) за 2020. годину, Србија се и даље налази у групи земаља са високим стопама оболевања и умирања у Европи.

Када је реч о оболевању од рака грлића материце, Србија се, после Црне Горе, Румуније, Естоније и Литваније, налази на петом месту у Европи. По умирању од рака грлића материце наша земља се налази на другом месту у Европи, одмах после жена у Црној Гори.