

Предлог мера Института за јавно здравље Србије у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом дечије парализе у Сирији/циркулације дивљег полио вируса у Израелу

У складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом дечије парализе/изолације дивљег полио вируса у циркулацији у Израелу и Сирији, а на основу плана активности за одржавање статуса земље без дечије парализе у Србији, Институт за јавно здравље Србије је доставио мрежи института/завода за јавно здравље и Министартсву здравља информацију о актуелној епидемиолошкој ситуацији дечије парализе у Израелу и Сирији и предлог мера за спречавање ширења дивљег вируса дечије парализе у случају уношења у земљу:

1. Све здравствене установе на територији надлежности **упознате су са актуелном епидемиолошком ситуацијом дечије парализе.**
2. Подсетити на **обавезу пријављивања из надзорних јединица** свих случајева акутне флакцидне парализе/АФП у складу са дефиницијом случаја, најбржим могућим путем.
3. О сваком случају, **окружни координатор за АФП најбржим путем обавештава националног координатора за АФП, спроводи епидемиолошко истраживање и организује прикупљање и транспорт узорака столице.**
4. На вакциналним пунктовима **спровести ревизију картотека и спровести имунизацију против полиомијелитиса све невакцинисане и непотпуно вакцинисане и ревакцинисане деце према узрасту** у складу са Правилником о имунизацији и начину заштите лековима („Сл. гласник РС”, 11/06, 25/13, 65/13).
5. У сарадњи са медијаторима Рома у срединама где они бораве евидентирати **невакцинисану и непотпуно вакцинисану децу у ромској популацији и реализовати њихову имунизацију против полиомијелитиса** у складу са Правилником о имунизацији и начину заштите лековима („Сл. гласник РС”, 11/06, 25/13, 65/13), преко територијално надлежних домова здравља уз координацију ИЗЈ/ЗЗЈ.
6. **Особе које се налазе у азилима (пореклом из ендемских земаља, Израела, Сирије)** вакцинисати у зависности од вакциналног статуса, а према Правилнику о имунизацији и начину заштите лековима („Сл. гласник РС”, 11/06, 25/13, 65/13).

Вакцинацију деце до годину дана живота спровести са ОПВ у три дозе у размаку не краћем од 6 недеља, изузев имунодефицијентне деце и њихових контаката када се спроводи са 3 дозе ИПВ у размацима не краћим од 4 недеље. Вакцинацију деце од навршених 1 године живота, као и одраслих спровести давањем прве дозе ИПВ, а потом након месец дана са три дозе ОПВ у размацима не краћим од 6 недеља. Особе које имају податке о вакцинацији, а непотпун вакцинални статус вакцинисати оном вакцином којом је

претходно реализована имунизација (ОПВ или ИПВ), у размацама предвиђеним за давање (од 6 односно 4 недеље до употпуњавања статуса).

Територијално надлежни завод за јавно здравље треба да направи процену потребног броја и врсте вакцина против полиомијелитиса који је потребан за имунизацију и достави одсеку за имунизацију ИЗЈ Србије.

7. Путнике у међународном саобраћају који одлазе у Авганистан, Пакистан, Нигерију, Сирију, Израел вакцинирати у складу са препорукама СЗО пред полазак на пут.