

Информација о актуелној епидемиолошкој ситуацији грознице Западног Нила на територији Републике Србије у 2024. години

40. недеља (30. септембар–6. октобар 2024. године)

На основу података достављених Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, на територији Републике Србије до 7.10.2024. године регистрована су 62 аутохтона случаја оболевања од грознице Западног Нила у хуманој популацији. Пријављени случајеви су са територије: Града Београда (21 случај), Јужнобачког (девет случаја), Јужнобанатског (шест случајева), Подунавског (пет случајева), Средњобанатског (три случаја), Шумадијског (три случаја), Сремског (три случаја), Мачванског (четири случаја), Западнобачког (два случаја), Браничевског (два случаја), Севернобачког (један случај), Рашког (један случај), Севернобанатског (један случај), Косовског (један случај) округа. Од укупног броја оболелих 42 особе су мушког пола, док је 20 женског. Просечна старост оболелих је 59 година.

Регистрована су и четири случаја грознице Западног Нила са вероватним местом заражавања ван Србије, и то: два случаја са местом заражавања у Грчкој и по један у Хрватској и Црној Гори.

Према последњем извештају Европског центра за превенцију и контролу болести, од 4. октобра 2024. године, у сезони надзора 2024. године, до 2. октобра 2024. године, случајеве инфекције вируса Западног Нила код људи је пријавило 13 земаља Европске уније (ЕУ) и Европске економске заједнице (ЕЕЗ), и то: Аустрија, Бугарска, Хрватска, Чешка, Мађарска, Румунија, Француска, Немачка, Италија, Грчка, Словачка, Словенија и Шпанија. Ван ЕУ/ЕЕЗ случајеви грознице Западног Нила се региструју и у Албанији, Северној Македонији и Турској.

Грозница Западног Нила је сезонско обољење које се преноси убодом зараженог комарца. Главни вектор, односно преносилац вируса Западног Нила је *Culex pipiens*, врста комарца која је одомаћена и код нас. Сезона трансмисије вируса Западног Нила у Србији уобичајено траје од јуна до новембра месеца.

У циљу смањења ризика од заражавања вирусом Западног Нила, препоручује се примена мера личне заштите од убода [комараца](#), и то:

- Употреба репелената на откривеним деловима тела приликом боравка на отвореном.
- Ношење одеће дугих рукава и ногавица, светле боје.
- Препоручљиво је да одећа буде комотна, јер комарци могу да убадају кроз припијену одећу.
- Избегавање боравка на отвореном у периоду најинтензивније активности комараца – у сумрак и у зору.
- Употреба заштитне мреже против комараца на прозорима, вратима и око кревета.
- Редукција броја комараца у затвореном простору.

- По могућству боравак у климатизованим просторима, јер је број инсеката у таквим условима значајно смањен.
- Избегавање подручја са великим бројем инсеката, као што су шуме и мочваре.
- Смањење броја комараца на отвореном где се ради, игра или борави, што се постиже исушивањем извора стајаће воде. На тај начин смањује се број места на које комарци могу да положе своја јаја. Најмање једном недељно треба испразнити воду из саксија за цвеће, посуда за храну и воду за кућне љубимце, из канти, буради и лименки. Уклонити одбачене гуме и друге предмете који могу да прикупљају воду.
- У случају путовања у иностранство, поготово ако се ради о тропском и субтропском подручју, обавезно се придржавати свих наведених мера превенције.
- У случају појаве било каквих симптома који су компатибилни са неуроиназивним обликом болести, одмах се јавити изабраном лекару.

Грозница Западног Нила Мере личне заштите

Најлакши и најефикаснији начин превенције болести изазване вирусом Западног Нила је спречити увод комарца.



- Носити комотну одећу светлих боја, дугих рукава и ногавица, јер комарци убадају кроз прилијепу одећу.



- Током боравака на отвореном дану и ноћу користити репелент за кожу!
- Наносити репелент само на отворена делове тела!
- Користити само регистрована репелент* чије су активне супстанце DEET, N-diethyl-m-toluamide, перанот, уље лаванде, итд!
- Креме са UV заштитним фактором, нанети пре репелента!
- Увек пратити упутство произвођача!
- Не наносити репелент на кожу испод одеће!




- Не користити репелент код новорођенчади млађе од два месеца старости, већ их обући у одећу дугих рукава и ногавица, а колико кречке и носеће заштитити мрежама за заштиту беба од комараца!
- Родитељи, нанесите репелент на своје шавице па затим на лице водите детета!
- Не наносити репелент на шавице, уста, очи и оштећену/иритисану кожу детета!
- Пратити упутство произвођача када се наноси репелент на кожу дечије!

Заштитите просторије од комараца!



- Боравите у климатизованим просторијама са затвореним зрацима и прозорима или у просторијама са постављеним комарцима заштитним мрежама против комараца на прозорима и прозорима!
- Користити заштитну мрежу око кревета када:
 - * просторија није климатизована,
 - * просторија није вентилирана,
 - * спавате на отвореном!

* Репеленти у употреби су „Дететски репелент“ и „Дететски репелент“ Министарства за заштиту животне средине Републике Србије. Јавно објављено пре припреме јавног информисања (информационо-образовно-пропагандне кампање) за превенцију болести изазване вирусом Западног Нила (www.batut.org.rs)



www.batut.org.rs

У циљу тачног информисања Институт за јавно здравље Србије ће у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом, као и до сада, јавност информисати путем званичне веб стране (www.batut.org.rs) и средстава јавног информисања.