

Информација о актуелној епидемиолошкој ситуацији грознице Западног Нила на територији Републике Србије у 2026. години

40. недеља (28. септембар – 4. октобар 2026. године)

На основу података достављених Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, на територији Републике Србије је, од почетка сезоне надзора, 1. јуна 2026. године, до 4. октобра 2026. године, регистровано укупно 58 случајева оболевања од грознице Западног Нила, од чега је 49 случајева са неуроинвазивним обликом болести. Случајеви су регистровани на територији 12 округа: Града Београда (23 случаја), Јужнобачког (девет случајева), Шумадијског (седам случајева), Средњобанатског (пет случајева), Јужнобанатског (четири случаја), Севернобанатског (два случаја), Расинског (два случаја), Поморавског (два случаја), Западнобачког (један случај), Браничевског (један случај), Рашког (један случај) округа и са територије надлежности завода за јавно здравље Косовска Митровица (један случај). Међу оболелима је 35 особа мушког и 23 особе женског пола. Просечна старост оболелих је 64 године.

У сезони надзора 2026. године, закључно са 30. септембром 2026. године, у државама Европске уније (ЕУ) и Европског економског простора (ЕЕП) случајеви оболевања од грознице Западног Нила код људи регистровани су у: Италији, Грчкој, Румунији, Шпанији, Француској, Немачкој, Аустрији, Холандији, Хрватској, Кипру, Мађарској и Белгији. У региону је оболевање регистровано и у Северној Македонији и Албанији.

Од почетка сезоне трансмисије 2026. године, закључно са 30. септембром, укупно је идентификовано 188 подручја захваћених вирусом Западног Нила у 14 европских земаља. Захваћена подручја су регистрована у: Италији (67), Француској (25), Грчкој (24), Румунији (24), Холандији (15), Шпанији (6), Хрватској (5), Белгији (5), Северној Македонији (5), Мађарској (4), Немачкој (3), Аустрији (3), Албанији (1) и Кипру (1).

У ових 14 земаља пријављено је укупно 1705 локално стечених случајева инфекције вирусом Западног Нила код људи: у Италији 721, Грчкој 420, Шпанији 131, Француској 128,

Румунији 117, Северној Македонији 70, Холандији 57, Хрватској 15, Белгији 14, Кипру 13, Аустрији 8, Мађарској 5, Немачкој 4 и Албанији 2 случаја.

Грозница Западног Нила је сезонско обољење које се преноси убомом зараженог комарца. Главни вектор, односно преносилац вируса Западног Нила је *Culex pipiens*, врста комарца која је одомаћена и код нас. Сезона трансмисије вируса Западног Нила у Србији уобичајено траје од јуна до новембра месеца.

У циљу смањења ризика од заражавања вирусом Западног Нила, препоручује се примена мера личне заштите од убода комараца, и то:

- Употреба репелената на откривеним деловима тела приликом боравка на отвореном.
- Ношење одеће дугих рукава и ногавица, светле боје.
- Препоручљиво је да одећа буде комотна, јер комарци могу да убадају кроз припијену одећу.
- Избегавање боравка на отвореном у периоду најинтензивније активности комараца – у сумрак и у зору.
- Употреба заштитне мреже против комараца на прозорима, вратима и око кревета.
- Редукција броја комараца у затвореном простору.
- По могућству боравак у климатизованим просторима, јер је број инсеката у таквим условима значајно смањен.
- Избегавање подручја са великим бројем инсеката, као што су шуме и мочваре.
- Смањење броја комараца на отвореном где се ради, игра или борави, што се постиже исушивањем извора стајаће воде. На тај начин смањује се број места на које комарци могу да положи своја јаја. Најмање једном недељно треба испразнити воду из саксија за цвеће, посуда за храну и воду за кућне љубимце, из канти, буради и лименки. Уклонити одбачене гуме и друге предмете који могу да прикупљају воду.
- У случају путовања у иностранство, поготово ако се ради о тропском и субтропском подручју, обавезно се придржавати свих наведених мера превенције.

- У случају појаве било каквих симптома који су компатибилни са неуроиназивним обликом болести, одмах се јавити изабраном лекару.

Грозница Западног Нила

Мере личне заштите

Најлакши и најефикаснији начин превенције болести изазване вирусом Западног Нила је спречити увод комарца.



- Носити комотну одећу светлих боја, дугих рукава и ногавица, јер комарци убадају кроз припијену одећу.
- Током боравка на отвореном дану и ноћу користити репеленте за кожу!
- Наносити репелент само на откривене делове тела!
- Користити само регистроване репеленте* чије су активне супстанце *N, N-diethyl-m-toluamid*, гераниол, уље лаванде, итд!
- Креме са УВ заштитним фактором, нанети пре репелента!
- Увек пратити упутство произвођача!
- Не наносити репелент на кожу испод одеће!











- Избежавати боравак на отвореном у време најинтензивније активности комараца—у сумрак и зору.
- Избежавати подручја са великим бројем инсеката, као што су шуме и мочваре.
- Најмање једном недељно испразнити воду из саксија за цвеће и посуда за храну за кућне љубимце.
- Уклонити непотребне посуде које се пуне кишницом као што су аутогуме, боце и лименке из дворишта!
- Све посуде са водом на отвореном морају бити затворене поклопцем, јер комарци легу јаја у стајаћим водама.

* Репеленти уписани на „Привременој листи бицицидних производа“, Министарства за заштиту животне средине Републике Србије (www.ekologija.gov.rs/organizacija/sektor/sektor-za-uvpravljanje-zivotnom-sredinom/odejenje-za-hemikalije/informativni-pult-za-hemikalije-i-biocidne-proizvode/biocidni-proizvodi)

Заштитите просторије од комараца!

- Боравите у климатизованим просторијама са затвореним вратима и прозорима или у просторијама са постављеним комарницама /заштитним мрежама против комараца на вратима и прозорима!
- Користити заштитну мрежу око кревета када:
 - просторија није климатизована,
 - просторија нема комарнике,
 - спавате на отвореном!

www.batut.org.rs

У циљу тачног информисања Институт за јавно здравље Србије ће у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом, као и до сада, јавност информисати путем званичне веб-странице (www.batut.org.rs) и средстава јавног информисања.