

Извештај о епидемиолошкој ситуацији грипа у 3. извештајној недељи, сезона 2025/2026.

Епидемиолошки надзор над грипом у сезони 2025/2026. започео је 29. септембра 2025. године недељним праћењем и извештавањем у складу са дефиницијама случаја, из надзорних јединица на територији надлежности, у дефинисаном временском периоду. У посматраном периоду континуирано се спроводи мониторинг епидемиолошких, клиничких и вирусолошких карактеристика обољења.

Обољења слична грипу

У току 3. извештајне недеље, од 12.1.2026. до 18.1.2026. године, у Републици Србији према популационом надзору забележена су укупно 11.483 случаја обољења сличних грипу са инциденцијом од 172,30/100.000 становника, што је за 15,6% ниже у поређењу са претходном недељом.

Епидемиолошки показатељи за ову извештајну недељу указују да се и даље региструје широка географска раширеност, клиничка активност грипа је на средњем нивоу, изнад епидемијског прага, док је тренд инциденције опадајући.

И у овој извештајној недељи се највише узрасно-специфичне стопе региструју код деце у узрасној групи од 0 до 4 године (стопа инциденције износи 497,81/100.000) и 5 до 14 (стопа инциденције од 284,09/100.000 становника), мада се у поређењу са претходном извештајном недељом бележи смањење учесталости оболевања по свим добним групама осим у добној групи 30 до 64 године.

Акутне респираторне инфекције

У току 3. извештајне недеље, према подацима сентинелног надзора над акутним респираторним инфекцијама (у одабраним здравственим установама) регистровано је укупно 10.013 случајева оболевања од акутних респираторних инфекција, са стопом инциденције од 832,33/100.000 становника, што је за 10,7% мање у поређењу са претходном недељом.

Лабораторијски потврђени случајеви грипа у сезони надзора 2025/2026.

У 3. извештајној недељи путем Сервиса јавног здравља пријављени су лабораторијски потврђени случајеви инфекције вирусом грипа тип АН3, А нетипизирани и А(Н1)рdm09 са територија града Београда, Јужнобанатског, Севернобанатског, Сремског, Мачванског, Моравичког, Зајечарског, Пчињског, Поморавског, Шумадијског, Рашког, Расинског, Нишавског и Јабланичког округа.

Епидемиолошка ситуација у земљама ЕУ/ЕЕА

Према доступним подацима за 2. извештајну недељу, стопа обољења сличних грипу је изнад основног нивоа у 23 земље, а стопе акутних респираторних инфекција су повишене у шест земаља (Албанија, Бугарска, Чешка, Немачка, Шпанија и Уједињено Краљевство).

Посматрано на регионалном нивоу, пик активности је достигнут у 50. недељи. Пик активности грипа је достигнут или је у току у свим, сем у малом броју земаља и подручја. Међутим, активност грипа и даље остаје висока и широко распрострањена, у условима мањег обима тестирања у последње три недеље. Особе старије од 65 година чине највећи удео хоспитализација због грипа. На регионалном нивоу, вирус грипа типа А(Н3) остаје доминантан у циркулацији, док је у пет земаља кодоминантан са А(Н1).

Проценат позитивности сентинелних узорака на грип износио је 32%. На примарном нивоу здравствене заштите 99% детектованих вируса грипа били су тип А, са доминантним учешћем А(Н3) од 78% и А(Н1)рdm09 – 22%.

Од 37 земаља и територија које су известиле о интензитету грипа, 25 је пријавило средњи или виши интензитет, док је 33 пријавило регионалну или широку распрострањеност грипа.

Извор: WHO. (2026). WHO European Region Summary, Week 2/2026 (5–11 January 2026). ERVISS.

Преузето са: <https://erviss.org/>