

Извештај о епидемиолошкој ситуацији грипа у 6. извештајној недељи, сезона 2025/2026.

Епидемиолошки надзор над gripом у сезони 2025/2026. започео је 29. септембра 2025. године недељним праћењем и извештавањем у складу са дефиницијама случаја, из надзорних јединица на територији надлежности, у дефинисаном временском периоду. У посматраном периоду континуирано се спроводи мониторинг епидемиолошких, клиничких и вирусолошких карактеристика обољења.

Обољења слична грипу

У току 6. извештајне недеље, од 2.2.2026. до 8.2.2026. године, у Републици Србији према популационом надзору забележено је укупно 8478 случајева обољења сличних грипу са инциденцијом од 127,21/100.000 становника, што је за 8,8% ниже у поређењу са претходном недељом.

Епидемиолошки показатељи за ову извештајну недељу указују да се у Републици Србији региструје регионална географска раширеност, клиничка активност грипа је испод епидемијског прага, док је тренд инциденције опадајући.

И у овој извештајној недељи се највише узрасно-специфичне стопе региструју код деце у узрасној групи од 0 до 4 године (стопа инциденције износи 483,49/100.000) и 5 до 14 (стопа инциденције од 286,73/100.000 становника).

Акутне респираторне инфекције

У току 6. извештајне недеље, према подацима сентинелног надзора над акутним респираторним инфекцијама, који се спроводи у одабраним здравственим установама, регистрован је укупно 12.621 случај оболевања од акутних респираторних инфекција, са стопом инциденције од 1000,96/100.000 становника, што је за 8,2 више у поређењу са претходном недељом.

Лабораторијски потврђени случајеви грипа у 6. извештајној недељи

У 6. извештајној недељи путем Сервиса јавног здравља пријављени су лабораторијски потврђени случајеви инфекције вирусом грипа тип АНЗ, А нетипизирани, А(Н1)рdm09 са територија града Београда, Јабланичког, Мачванског, Нишавског, Пчињског, Севернобанатског, Шумадијског и Златиборског округа.

Епидемиолошка ситуација у земљама ЕУ/ЕЕА

Према доступним подацима за 5. извештајну недељу, стопа обољења сличних грипу је изнад основног нивоа у 18, а стопе акутних респираторних инфекција су повишене у пет земаља (Бугарска, Немачка, Литванија, Шпанија и Уједињено Краљевство – Енглеска).

Након достизања пика оболевања у 52. недељи, дошло је до смањења регионалних показатеља активности грипа, али се у претходне три недеље одржава на стабилном, повишеном нивоу. Међутим, у мањем броју земаља региструје се раст активности грипа. Вирус грипа типа А(НЗ) и даље је доминантни сој у циркулацији широм региона.

Проценат позитивности сентинелних узорака на грип износио је 33%, у односу на 30% из претходне недеље, док је 19 земаља пријавило позитивност која је изнад епидемијског прага од 10%.

Вирус грипа тип А био је доминантан, са следећом заступљеношћу подтипова: А(НЗ) (74%) и А(Н1)рdm09 (26%).

Од 33 земље и територије које су известиле о интензитету грипа, 18 су пријавиле средњи или виши интензитет, док је 29 земаља пријавило регионалну или широку распрострањеност грипа.

Извор: WHO. (2026). WHO European Region Summary, Week 5/2026 (26 January-1 February 2026). ERVISS.

Преузето са: <https://erviss.org/>