

Мере превенције:

- Редовно вакцинисање паса и мачака.
- Едукација власника животиња и јавности о важности рестриктивних мера према псима и мачкама – да љубимци морају бити на узици када нису у затвореном простору, да животиње са неуобичајеним понашањем или оболеле животиње било које врсте не треба додиривати и хватати и да не треба држати дивље животиње као кућне љубимце.
- Спровођење активног надзора беснила код животиња.
- Уништавање паса и мачака луталица.
- Пријављивања животиња сумњивих на беснило.
- Затварање у карантин и клиничко посматрање током 10 дана сваког здравог пса или мачке који су повредили или ујели човека.
- Обавезно и хитно слање материјала на преглед – све кућне љубимце који показују знаке сумњиве на беснило треба жртвовати и прегледати на беснило. Све дивље животиње које су ујеле човека одмах жртвовати и послати материјал на преглед.
- Перорална имунизација резервоара помоћу атенуиране и рекомбиноване вакцине – бацање мамаца са вакцином из ваздуха показала се ефикасном мером у елиминацији беснила лисица.
- Вакцинација лица која су професионално изложена повећаном ризику од инфекције (ветеринари, шумари, лабораторијски и теренски радници који раде у вези са беснилом, као и лица која бораве у току дужег периода у ендемским пределима). Преекспозициона вакцинација против беснила спроводи се давањем три појединачне дозе вакцине против беснила по шеми 0, 7. и 21. дана.