

Информација о актуелној епидемиолошкој ситуацији грознице Западног Нила на територији Републике Србије у 2025. години

29. недеља (14–20. јула 2025. године)

На основу података достављених Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” на територији Републике Србије до 20. јула 2025. године регистрована су два случаја оболевања од грознице Западног Нила у хуманој популацији. Пријављени случајеви су са територије: Града Београда (један случај) и Јужнобанатског округа (један случај). Оболене особе су мушког пола, старије од 65 година.

У сезони надзора 2025. године, до 16. јула 2025. године у државама Европске уније (ЕУ) и Европске економске заједнице (ЕЕЗ) пријављено је девет случајева оболевања од грознице Западног Нила у хуманој популацији, и то у: Грчкој (4), Италији (4), Румунији (1).

Грозница Западног Нила је сезонско обољење које се преноси убодом зараженог комарца. Главни вектор, односно преносилац вируса Западног Нила је *Culex pipiens*, врста комарца која је одомаћена и код нас. Сезона трансмисије вируса Западног Нила у Србији уобичајено траје од јуна до новембра месеца.

У циљу смањења ризика од заражавања вирусом Западног Нила, препоручује се примена мера личне заштите од убода комараца, и то:

- Употреба репелената на откривеним деловима тела приликом боравка на отвореном.
- Ношење одеће дугих рукава и ногавица, светле боје.
- Препоручљиво је да одећа буде комотна, јер комарци могу да убадају кроз припијену одећу.
- Избегавање боравка на отвореном у периоду најинтензивније активности комараца – у сумрак и у зору.
- Употреба заштитне мреже против комараца на прозорима, вратима и око кревета.
- Редукција броја комараца у затвореном простору.
- По могућству боравак у климатизованим просторима, јер је број инсеката у таквим условима значајно смањен.
- Избегавање подручја са великим бројем инсеката, као што су шуме и мочваре.
- Смањење броја комараца на отвореном где се ради, игра или борави, што се постиже исушивањем извора стајаће воде. На тај начин смањује се број места на које комарци могу да положи своја јаја. Најмање једном недељно треба испразнити воду из саксија за цвеће, посуда за храну и воду за кућне љубимце, из канти, буради и лименки. Уклонити одбачене гуме и друге предмете који могу да прикупљају воду.

- У случају путовања у иностранство, поготово ако се ради о тропском и субтропском подручју, обавезно се придржавати свих наведених мера превенције.
- У случају појаве било каквих симптома који су компатибилни са неуроиназивним обликом болести, одмах се јавити изабраном лекару.

Грозница Западног Нила

Мере личне заштите

Најлакши и најефикаснији начин превенције болести изазване вирусом Западног Нила је спречити убој комараца.



- Носити комотну одећу светлих боја, дугог рукава и ногавица, јер комарци убађу кроз прилијену одећу.



- Током боравка на отвореном дану и ноћу користити репеленте за кожу!
- Наносити репелент само на откривене делове тела!
- Користити само регистрована репеленте*, чије су активне супстанце N, N-diethyl-m-toluamide, перметрин, улте лаванда, итд!
- Креме са UV заштитним фактором, нанети пре репелента!
- Увек пратити упутство произвођача!
- Не наносити репелент на кожу испод одеће!




- Не користити репелент код новорођенчади млађе од два месеца старости, већ их обући у одећу дугог рукава и ногавица, а колико, кревета и носити заштитне мрежама за заштиту беба од комараца!
- Роditelji, нанесите репелент на своје шаке пре него што га гледате дете!
- Не наносити репелент на шаке, уста, очи и оштећену/иритисану кожу детета!
- Пратити упутство произвођача када се наноси репелент на кожу деце!

Заштитите просторије од комараца!



- Избежавати боравак на отвореном у време најинтензивније активности комараца – у сумрак и зору.
- Избежавати подручја са великим бројем инсеката, као што су шуме и мочваре.
- Најмање једном недељно испразните воду из саксија за цвеће и посуду за храну за кућне љубимце.
- Уклоните непотребне посуде које се луле кишницом као што су аутомате, боце и лименке из дворишта!
- Све посуде са водом на отвореном морају бити затворене поклопцем, јер комарци легу јаја у стајаћим водама.



- Боравите у климатизованим просторијама са затвореним вратима и прозорима или у просторијама са постављеним комарцима заштитним мрежама против комараца на вратима и прозорима!
- Користити заштитну мрежу око кревета када:
 - просторија није климатизована,
 - просторија има комарчиња,
 - спаваће на отвореном!

* Репеленти су означени на „Препорукама заштите болесних просторија“. Министарство за заштиту животне средине Републике Србије. Јавно информационо-консултантско одељење заштите животне средине. Контакт: центар заштите животне средине (www.zs-zs.gov.rs) или на е-пошту (zivotna.sredina@zivotna.gov.rs)

www.batut.org.rs

У циљу тачног информисања Институт за јавно здравље Србије ће у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом, као и до сада, јавност информисати путем званичне веб-странице (www.batut.org.rs) и средстава јавног информисања.