

Информација о актуелној епидемиолошкој ситуацији грознице Западног Нила на територији Републике Србије у 2023. години

Недеља 30, 24–30. септембар 2023. године

На основу података достављених Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” (у складу са Препорукама за надзор над грозницом Западног Нила у хуманој популацији у сезони 2023. године Института за јавно здравље Србије) и лабораторијских критеријума (према препорукама Европског центра за превенцију и контролу болести) на територији Републике Србије до 30.9.2023. године регистрована су укупно 84 аутохтона случаја оболевања од грознице Западног Нила у хуманој популацији. Пријављени случајеви су са територије Града Београда (21), Јужнобачког (22), Сремског (9), Западнобачког (8), Јужнобанатског (6), Средњобанатског (4), Браничевског (3), Севернобачког (2), Колубарског (2), Мачванског (2), Поморавског (2), Севернобанатског (2) и Нишавског (1) округа. Оболеле особе су мушког (51 случај) и женског пола (33), старости од 18 до 89 година.

У сезони надзора 2023. године, до 27.9.2023. године у државама Европске уније (ЕУ) и Европске економске заједнице (ЕЕЗ) пријављено је укупно 566 случајева оболевања од грознице Западног Нила у хуманој популацији, и то у: Италији (280), Грчкој (143), Румунији (63), Француској (34), Мађарској (27), Шпанији (8), Хрватској (6), Немачкој (4) и Кипру (1).

У Северној Македонији пријављен је један случај оболевања од грознице Западног Нила.

У сезони надзора 2023. године, до 27.9.2023. године у државама Европске уније (ЕУ) и Европске економске заједнице (ЕЕЗ), регистровано је 46 смртних исхода који се могу довести у везу са грозницом Западног Нила, и то: у Грчкој (19), Италији (17), Румунији (9) и Шпанији (1).

Грозница Западног Нила је сезонско обољење које се преноси убодом зараженог комарца. Главни вектор, односно преносилац вируса Западног Нила је *Culex pipiens*, врста комарца која је одомаћена и код нас. Сезона трансмисије вируса Западног Нила у Србији уобичајено траје од јуна до новембра месеца.

У циљу смањења ризика од заражавања вирусом Западног Нила, препоручује се примена мера личне заштите од убода [комараца](#), и то:

- Употреба репелената на откривеним деловима тела приликом боравка на отвореном.
- Ношење одеће дугих рукава и ногавица, светле боје.
- Препоручљиво је да одећа буде комотна, јер комарци могу да убадају кроз припијену одећу.

- Избегавање боравка на отвореном у периоду најинтензивније активности комараца – у сумрак и у зору.
- Употреба заштитне мреже против комараца на прозорима, вратима и око кревета.
- Редукција броја комараца у затвореном простору.
- По могућству боравак у климатизованим просторима, јер је број инсеката у таквим условима значајно смањен.
- Избегавање подручја са великим бројем инсеката, као што су шуме и мочваре.
- Смањење броја комараца на отвореном где се ради, игра или борави, што се постиже исушивањем извора стајаће воде. На тај начин смањује се број места на које комарци могу да положи своја јаја. Најмање једном недељно треба испразнити воду из саксија за цвеће, посуда за храну и воду за кућне љубимце, из канти, буради и лименки. Уклонити одбачене гуме и друге предмете који могу да прикупљају воду.
- У случају путовања у иностранство, поготово ако се ради о тропском и субтропском подручју, обавезно се придржавати свих наведених мера превенције.
- У случају појаве било каквих симптома који су компатибилни са неуроиназивним обликом болести, одмах се јавити изабраном лекару.

Грозница Западног Нила

Мере личне заштите

Најлакши и најефикаснији начин превенције болести изазване вирусом Западног Нила је спречити увод комараца.



- Носити комотну одећу светлих боја, дугих рукава и nogавица, јер комарци убадују кроз промјену одећу.



- Током боравка на отвореном дану и ноћу користити репелент за кожу!
- Наносити репелент само на отаривене делове тела!
- Користити само регистрована репелента*, чије су активне супстанце N, N-diethyl-m-toluamide, pirantran, ulje lavande, итд!
- Креме са UV заштитним фактором, нанети пре репелента!
- Увек пратити упутство произвођача!
- Не наносити репелент на кожу испод одеће!




- Не користити репелент код новорођенчади млађе од два месеца старости, већ их обући у одећу дугих рукава и nogавица, а испод кревета и носити заштитне мрежама за заштиту беба од комараца!
- Родитељи, нанесите репелент на своје шавице на зглобу на глењу врату дјетета!
- Не наносити репелент на шавице, уста, очи и оштећену/иритисану кожу дјетета!
- Пратити упутство произвођача када се наноси репелент на кожу дјетета!

Заштитите просторије од комараца!



- Избежавати боравак на отвореном у време најинтензивније активности комараца – у сумрак и зору.
- Избежавати подручја са великим бројем инсеката, као што су шуме и мочваре.
- Најмање једном недељно испразнити воду из саксија за цвеће и посуду за храну за кућне љубимце.
- Уклонити непотребне посуде где се луле кишница као што су аутогуме, боце и лименке из дворашта!
- Све посуде за водом на отвореном морају бити затворене поклопцем, јер комарци легу јаја у стајаћим водама.



- Боравите у климатизованим просторијама са затвореним вратима и прозорима или у просторијама са постављеним комарцима (заштитним мрежама) против комараца на вратима и прозорима!
- Користити заштитну мрежу око кревета када:
 - просторија није климатизована,
 - просторија није коларана,
 - спавате на отвореном!

* Репеленти у земљи не: Дипентонил, метил бензилонил пропилат. Министарство за заштиту животне средине Републике Србије. Јавна агенција за заштиту животне средине Србије. Контакт: 011 2623 2323. Веб-страница: www.azps.gov.rs

www.bahut.org.rs

У циљу тачног информисања Институт за јавно здравље Србије ће у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом, као и до сада, јавност информисати путем званичне веб стране (www.batut.org.rs) и средстава јавног информисања.