

Информација о актуелној епидемиолошкој ситуацији грознице Западног Нила на територији Републике Србије у 2025. години

32. недеља (4– 10. августа 2025. године)

На основу података достављених Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, на територији Републике Србије до 10. августа 2025. године регистровано је десет случајева оболевања од грознице Западног Нила у хуманој популацији. Пријављени случајеви су са територије: Јужнобачког (четири случаја), Града Београда (три случаја), Поморавског (један случај), Јужнобанатског (један случај) и Средњобанатског округа (један случај). Међу оболелима шест особа су мушког пола и четири женског. Просечна старост оболелих је 67,8 година.

У сезони надзора 2025. године, до 6. августа 2025. године у државама Европске уније (ЕУ) и Европске економске заједнице (ЕЕЗ) случајеви оболевања од грознице Западног Нила у хуманој популацији су регистровани у Грчкој, Италији, Румунији, Француској, Бугарској и Мађарској.

Грозница Западног Нила је сезонско обољење које се преноси убомом зараженог комарца. Главни вектор, односно преносилац вируса Западног Нила је *Culex pipiens*, врста комарца која је одомаћена и код нас. Сезона трансмисије вируса Западног Нила у Србији уобичајено траје од јуна до новембра месеца.

У циљу смањења ризика од заражавања вирусом Западног Нила, препоручује се примена мера личне заштите од убода комараца, и то:

- Употреба репелената на откривеним деловима тела приликом боравка на отвореном.
- Ношење одеће дугих рукава и ногавица, светле боје.
- Препоручљиво је да одећа буде комотна, јер комарци могу да убадају кроз припијену одећу.
- Избегавање боравка на отвореном у периоду најинтензивније активности комараца – у сумрак и у зору.

- Употреба заштитне мреже против комараца на прозорима, вратима и око кревета.
- Редукција броја комараца у затвореном простору.
- По могућству боравак у климатизованим просторима, јер је број инсеката у таквим условима значајно смањен.
- Избегавање подручја са великим бројем инсеката, као што су шуме и мочваре.
- Смањење броја комараца на отвореном где се ради, игра или борави, што се постиже исушивањем извора стајаће воде. На тај начин смањује се број места на које комарци могу да положи своја јаја. Најмање једном недељно треба испразнити воду из саксија за цвеће, посуда за храну и воду за кућне љубимце, из канти, буради и лименки. Уклонити одбачене гуме и друге предмете који могу да прикупљају воду.
- У случају путовања у иностранство, поготово ако се ради о тропском и субтропском подручју, обавезно се придржавати свих наведених мера превенције.
- У случају појаве било каквих симптома који су компатибилни са неуроиназивним обликом болести, одмах се јавити изабраном лекару.

Грозница Западног Нила

Мере личне заштите

Најлакши и најефикаснији начин превенције болести изазване вирусом Западног Нила је спречити убој комарца.



- Носити комотну одећу светлих боја, дугих рукава и ногавица, јер комарци убађу кроз протрпину одеће.



- Током боравака на отвореном дану и ноћу користити репеленте за кожу!
- Наносити репелент само на отворене делове тела!
- Користити само регистроване репеленте*, чије су активне супстанце N, N-diethyl-m-toluamide, перметрин, ултра лаванда, итд!
- Креме са UV заштитним фактором, нанети пре репелента!
- Увек пратити упутство произвођача!
- Не наносити репелент на кожу испод одеће!




- Не користити репелент код новорођенчади млађе од две месеца старости, већ их обући у одећу дугих рукава и ногавица, а користи, креветке и носећу заштитну мрежу за заштиту беба од комараца!
- Родитељи, нанесите репелент на своје шавице заштити лице вашег детета!
- Не наносите репелент на шавице, уста, очи и оштећену/иритирану кожу детета!
- Пратити упутство произвођача када се наноси репелент на кожу дечије!

Заштитите просторије од комараца!



- Избегавати боравак на отвореном у време најинтензивније активности комараца – у сумрак и зору.
- Избегавати подручја са великим бројем инсеката, као што су шуме и мочваре.
- Најмање једном недељно испразнити воду из саксија за цвеће и посуде за храну за кућне љубимце.
- Уклоните непотребне посуде које се луку кишница као што су аутогуме, боце и лименке из дворишта!
- Све посуде за воду на отвореном морају бити затворене поклопцем, јер комарци легу јаја у стајаћим водама.



- Боравите у климатизованим просторијама са затвореним вратима и прозорима или у просторијама са постављеним комарницама (заштитним мрежама) против комараца на вратима и прозорима!
- Користити заштитну мрежу око кревета када:
 - просторија није климатизована,
 - просторија није комарница,
 - ставате на отворено!

* Репеленти у складу са „Списаном лековитих биљних производа“, Министарство за здравље, заштити првенствено Републику Србију. Јавно објављено пре изградње јавног здравственог система. Додатно, репеленти се могу добити и из приватних апотека. Репеленти се могу добити и из приватних апотека.

www.bafut.org.rs

У циљу тачног информисања Институт за јавно здравље Србије ће у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом, као и до сада, јавност информисати путем званичне веб-странице (www.batut.org.rs) и средстава јавног информисања.