

## Информација о актуелној епидемиолошкој ситуацији грознице Западног Нила на територији Републике Србије у 2025. години

36. недеља (1– 7. септембра 2025. године)

На основу података достављених Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, на територији Републике Србије до 7. септембра 2025. године регистровано је 40 случајева оболевања од грознице Западног Нила у хуманој популацији. Случајеви оболевања су регистровани на територији 12 округа, и то: Града Београда (12 случајева), Јужнобачког (девет случајева), Средњобанатског (четири случаја), Браничевског (три случаја), Јужнобанатског (три случаја), Моравичког (два случаја), Севернобанатског (два случаја), Поморавског (један случај), Подунавског (један случај), Рашког (један случај), Шумадијског (један случај) и Западнобачког (један случај) округа. Међу оболелима доминирају особе мушког пола (60%). Просечна старост оболелих је 65 година.

У сезони надзора 2025. године, до 3. септембра 2025. године у државама Европске уније (ЕУ) и Европске економске заједнице (ЕЕЗ) случајеви оболевања од грознице Западног Нила у хуманој популацији су регистровани у Грчкој, Италији, Румунији, Француској, Бугарској, Мађарској, Шпанији и Албанији.

Грозница Западног Нила је сезонско обољење које се преноси убодом зараженог комарца. Главни вектор, односно преносилац вируса Западног Нила је *Culex pipiens*, врста комарца која је одомаћена и код нас. Сезона трансмисије вируса Западног Нила у Србији уобичајено траје од јуна до новембра месеца.

У циљу смањења ризика од заражавања вирусом Западног Нила, препоручује се примена мера личне заштите од убода комараца, и то:

- Употреба репелената на откритим деловима тела приликом боравка на отвореном.
- Ношење одеће дугих рукава и ногавица, светле боје.

- Препоручљиво је да одећа буде комотна, јер комарци могу да убадају кроз припијену одећу.
- Избегавање боравка на отвореном у периоду најинтензивније активности комараца – у сумрак и у зору.
- Употреба заштитне мреже против комараца на прозорима, вратима и око кревета.
- Редукција броја комараца у затвореном простору.
- По могућству боравак у климатизованим просторима, јер је број инсеката у таквим условима значајно смањен.
- Избегавање подручја са великим бројем инсеката, као што су шуме и мочваре.
- Смањење броја комараца на отвореном где се ради, игра или борави, што се постиже исушивањем извора стајаће воде. На тај начин смањује се број места на које комарци могу да положи своја јаја. Најмање једном недељно треба испразнити воду из саксија за цвеће, посуда за храну и воду за кућне љубимце, из канти, буради и лименки. Уклонити одбачене гуме и друге предмете који могу да прикупљају воду.
- У случају путовања у иностранство, поготово ако се ради о тропском и субтропском подручју, обавезно се придржавати свих наведених мера превенције.
- У случају појаве било каквих симптома који су компатибилни са неуроиназивним обликом болести, одмах се јавити изабраном лекару.

# Грозница Западног Нила

## Мере личне заштите

Најлакши и најефикаснији начин превенције болести изазване вирусом Западног Нила је спречити убој комарца.



- Носити комотну одићу светлих боја, дуних рукава и ногавица, јер комарци убадају кроз прстијену одићу.



- Током боравка на отвореном дану и ноћу користити репеленте за кожу!
- Наносити репелент само на отворене делове тела!
- Користити само регистроване репеленте\*, чије су активне супстанце N, N-diethyl-m-toluamide, перметрин, ултралаванде, итд!
- Креме са UV заштитним фактором, нанети пре репелента!
- Увек пратити упутство произвођача!
- Не наносити репелент на кожу испод одиће!



- Не користити репелент код новорођенчади млађе од два месеца старости, већ их обући у одићу дуних рукава и ногавица, а кочице, креветке и носилке заштитити мрежама за заштиту беба од комараца!
- Родитељи, нанесите репелент на своје шавке лазајући на лице вашег детета!
- Не наносити репелент на шавке, уста, очи и оштећену/иритирану кожу детета!
- Пратити упутство произвођача када се наноси репелент на кожу деце!

- Избежавати бораваке на отвореном у време најинтензивније активности комараца – у сумрак и зору.
- Избежавати подручја са великим бројем носката, као што су шуме и мочваре.
- Најмање једном недељно испразнити воду из сакоја за цвеће и посуду за храну за кућна љубимца.
- Уклонити непотребне посуде које се луле кишницма као што су аутогуме, боце и лименке из дворишта!
- Све посуде са водом на отвореном морају бити затворене поклопцем, јер комарци легу јаја у стајаћим водама.



Заштитите просторије од комараца!

- Боравите у климатизованим просторијама са затвореним вратима и прозорима или у просторијама са постављеним комарницама (заштитним мрежама) против комараца на вратима и прозорима!
- Користите заштитну мрежу око кревета када:
  - просторија није климатизована,
  - просторија није комарница,
  - спавате на отвореном!

\* Репеленти укључени на „Списак лекова који су забрањени за употребу“, Министарство за здравље, Министарство Републике Србије. (www.mz.gov.rs, www.vet.gov.rs, www.zdravstvo.gov.rs, www.mz.gov.rs, www.vet.gov.rs, www.zdravstvo.gov.rs)



www.batut.org.rs

У циљу тачног информисања Институт за јавно здравље Србије ће у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом, као и до сада, јавност информисати путем званичне веб-странице ([www.batut.org.rs](http://www.batut.org.rs)) и средстава јавног информисања.