


ОБРАТИ ПАЖЊУ НА


Око милион људи у Србији има латентну туберкулозну (ТБ) инфекцију.

ЛАТЕНТНУ ТБ ИНФЕКЦИЈУ




Латентна ТБ инфекција

Латентна ТБ инфекција значи да су бактерије код особе присутне у телу, али их нема доволно да би изазвале болест или пренеле бактерије на другу особу.



ТБ болест

Ако бактерије постану активне и умноже се, латентна ТБ инфекција може прећи у болест.



Без терапије,
1 од 10 особа
са латентном
ТБ инфекцијом
ће развити болест.

ОСОБЕ КОЈЕ ТРЕБА ТЕСТИРАТИ НА ЛАТЕНТНУ ТБ ИНФЕКЦИЈУ УКЉУЧУЈУ:



Особе из
контакта
са оболелим



Особе са другим
здравственим проблемима
који отежавају борбу са ТБ болешћу



Особе које проводе дуже време
у болницима и колективима
где је ТБ учесалија:

Болнице

Казнено
поправне
установе

Привремени
сместаји



ЛЕЧЕЊЕ ЛАТЕНТНЕ ТБ ИНФЕКЦИЈЕ МОЖЕ СПРЕЧИТИ БОЛЕСТ.




Тестом из крви и кожним тестом је могуће пронаћи латентну ТБ инфекцију.

Терапијски режими за латентну ТБ инфекцију:

6 месеци – употреба једног лека
3 месеца – употреба два лека.



За постављање дијагнозе латентне ТБ инфекције, осим позитивних резултата тестова, услов је нормалан РТГ снимак грудног коша и одсуство симптома активне ТБ болести.



ЕЛИМИНАЦИЈА ТБ КАО ЈАВНОЗДРАВСТВЕНОГ ПРОБЛЕМА ЗАХТЕВА ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА ТЕСТИРАЊЕМ ЛАТЕНТНЕ ТБ ИНФЕКЦИЈЕ И ПРИМЕНЕ ХЕМИОПРОФИЛАКСЕ.

Тестирање латентне ТБ инфекције је у Србији доступно на терет средстава РФЗО-а у следећим установама:

- Институту за микробиологију и имунологију Медицинског факултета у Београду
- Институту за плућне болести Војводине.



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА



ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ
Др Милан Јовановић Батут

