

KRETANJE INFLUENCE KOD NAS I U SVETU

izveštaj za 10. nedelju (2.3.2009 – 8.3.2009. godine)

Od ove sezone 2008/2009. nadzor nad influencom prate u međusobnoj saradnji EISS (Evropska mreža za nadzor nad influencom), ECDC (Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti) i Kolaborativni centar u Londonu WHO (Svetska zdravstvena organizacija).

Izveštaj (epidemiološke i virusološke podatke) za 10. nedelju 2009. godine u sezoni 2008/2009. poslale su 34 evropske zemlje. Nepotpune podatke (samo epidemiološke odnosno virusološke) poslalo je šest evropskih zemalja.

U odnosu na prethodnu nedelju male su promene influenza aktivnosti. Većina zemalja centralne/istočne Evrope izveštava o srednjoj influenza aktivnosti, dok zemlje zapadne Evrope izveštavaju o niskoj influenza aktivnosti. Predominantni virus u cirkulaciji Evropom je A (H3), dok je u zemljama gde influenza aktivnost raste virus influence B.

Visok intenzitet influenza aktivnosti registruje se u Hrvatskoj i Grčkoj. Srednji intenzitet influenza aktivnosti prijavilo je 16 zemalja, a nisku aktivnost prijavilo je 19 zemalja.

Generalno, visoka incidencija je registrovana u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine i u grupi od 5 do 14 godina, dok je u Irskoj, Velikoj Britaniji, Norveškoj i Rumuniji u uzrasnoj grupi od 15 do 64 godine.

U 10. nedelji 2009. – dvadeset drugoj izveštajnoj nedelji u sezoni 2008/2009. od 1747 uzoraka u 472 je potvrđen virus influence i to: 222 izolata virusa influence A i 250 izolata virusa influence B.

Od početka sezone 2008/2009. do danas ukupno je potvrđeno 24.045 izolata. Prema antigenskim/genetskim karakteristikama od 3056 izolata virusa influence: 2440 su A/Brisbane/10/2007(H3N2)-like, 161 su A/Brisbane/59/2007(H1N1)-like, 433 su B/Malaysia/2506/2004-like (B/Victoria/2/87 lineage) i 22 su B/Florida/4/2006-like (B/Yamagata/16/88 lineage).

Epidemiološka situacija u Republici Srbiji

Epidemiološki nadzor nad influencom od strane instituta i zavoda za javno zdravlje u Republici Srbiji uspostavljen je od 40. izveštajne nedelje (29.9 – 5.10.2008), kroz nedeljne izveštaje o kretanju oboljenja sličnih gripu (ILI). Pored epidemiološkog, sprovodi se i virusološki nadzor.

Virusološki nadzor nad gripom sprovodi se kroz sentinel nadzor i od početka sezone uzorkovano je 108 briseva ždrela i izolovani su virusi influence A H3 i virus influence B.

U 10. nedelji 2009. godine registrovano je 11.291 slučajeva oboljenja sličnih gripu (ILI) sa stopom od 151,29 na 100.000. Najviša stopa od 422,79 na 100.000. beleži se u uzrasnoj grupi od 5 do 14 godina.