

**Odeljenje za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti
Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”**

**POPULACIONI NADZOR NAD OBOLJENJIMA SLIČNIM GRIPU ZA SEZONU
2010/2011 GODINE**

Republika Srbija

Nedeljni izveštaj za 42. nedelju od 18.10.2010. do 24.10.2010.

Kratki pregled za Republiku Srbiju:

- Intenzitet aktivnosti influence u Republici Srbiji je nizak.
- U toku 42. izveštajne nedelje od 18.10.2010. do 24.10.2010. godine u Republici Srbiji beleži se 2870 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 39,05.
- Incidencija je ispod praga za epidemijski period.
- Najviša uzrasno specifična stopa od 117,23 beleži se u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine.

Laboratorijski nadzor:

- Tokom ove izveštajne nedelje poslata su tri sentinelnna uzorka, jedan nesentinelni uzorak i jedan uzorka ARDS-a u Referentnu laboratoriju za respiratorne viruse Instituta za virusologiju, vakcine i serume Torlak i svi su negativni na viruse influence.

Influenca aktivnost u Evropi

(podaci sa Euroflu – elektronskog nedeljnog biltena):

- Ovaj izveštaj je zasnovan na podacima dobijenim od 39 od ukupno 53 članice u Evropskom regionu, Svetske zdravstvene organizacije, SZO.
- Nivo aktivnosti gripa u Evropskom regionu je trenutno nizak.
- Od 633 sentinelnih uzoraka 12 (1,9%) je bilo pozitivno na virus influence.
- Tokom prethodne nedelje sporadično su otkriveni virusi influence A (H3N2), pandemijskog virusa (H1N1) 2009 i virusa influence B.

Incidencija oboljenja sličnih gripu na 100.000 stanovnika po uzrastu u 42. izveštajnoj nedelji u Republici Srbiji

Uzrast/ Izveštajna nedelja	0–4	5–14	15–29	30–64	65+
42	117,23	73,35	37,30	27,08	31,20

Kvalitativni pokazatelji za 42. nedelju u Republici Srbiji

Nedelja	Geografska raširenost	Intenzitet	Trend incidencije	Stepen opterećenja zdravstvene zaštite
42	nema aktivnosti	nizak	rastući	nizak

Dodatak:

- Baseline influenza aktivnost tj. prag za epidemijski period je nivo kliničke influenza aktivnosti koji ostaje tokom leta i većinom tokom zime. Definisani prag za Republiku Srbiju je incidencija 112/100.000.
- Obično je to period od šest do 12 nedelja tokom zime kada je nivo kliničke aktivnosti influence iznad baseline linije.