

**Одељење за превенцију и контролу заразних болести  
Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”**

**ПОПУЛАЦИОНИ НАДЗОР НАД ОБОЉЕЊИМА СЛИЧНИМ ГРИПУ ЗА  
СЕЗОНУ 2010/2011. ГОДИНЕ**

Република Србија

Недељни извештај за 51. недељу од 20.12.2010. до 26.12.2010.

Кратки преглед за Републику Србију:

- Интензитет активности инфлуенце у Републици Србији је низак.
- У току 51. извештајне недеље од 20.12.2010. до 26.12.2010. године у Републици Србији бележи се 3555 случајева обољења сличних грипу са инциденцијом од 48,37.
- Инциденција је испод прага за епидемијски период.
- Највиша узрасно специфична стопа од 213,72 бележи се у узрасној групи од 0 до 4 године.

Лабораторијски надзор:

- Током ове извештајне недеље послато је пет сентинелних узора, од тога један АРДС и један несентинелни узорак у Референтну лабораторију за респираторне вирусе Института за вирусологију, вакцине и серуме Торлак и сви су негативни на вирусе инфлуенце.

**Инфлуенца активност у Европи  
(подаци са Euroflu – електронског недељног билтена):**

- Овај извештај је заснован на подацима добијеним од 42 од укупно 53 чланице у Европском региону Светске здравствене организације, СЗО.
- Ниво активности грипа у већини земаља Европског региона је низак, али се повећава број потврђених случајева грипа.
- 34 % сентинелних узорака било је позитивно на вирус инфлуенце.
- У Европском региону се у циркулацији налазе вирус инфлуенце Б, вирус инфлуенце А (H3N2) и пандемијски вирус А (H1N1) 2009.

Инциденција обољења сличних грипу на 100.000 становника по узрасту у 51. извештајној недељи у Републици Србији

Узраст/ Извештајна недеља	0–4	5–14	15–29	30–64	65+
51	213,72	100,76	37,44	28,87	35,55

Квалитативни показатељи за 51. недељу у Републици Србији

Недеља	Географска раширеност	Интензитет	Тренд инциденције	Степен оптерећења здравствене заштите
51	нема активности	низак	растући	низак

Додатак:

- Baseline influenza активност тј. праг за епидемијски период је ниво клиничке инфлуенца активности који остаје током лета и већином током зиме. Дефинисани праг за Републику Србију је инциденција 112/100.000.
- Обично је то период од шест до 12 недеља током зиме када је ниво клиничке активности инфлуенце изнад baseline линије.