

**Одељење за превенцију и контролу заразних болести
Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”**

**ПОПУЛАЦИОНИ НАДЗОР НАД ОБОЉЕЊИМА СЛИЧНИМ ГРИПУ ЗА
СЕЗОНУ 2010/2011. ГОДИНЕ**

Република Србија

Недељни извештај за 52. недељу од 27.12.2010. до 2.1.2011.

Кратки преглед за Републику Србију:

- Интензитет активности инфлуенце у Републици Србији је низак.
- У току 52. извештајне недеље од 27.12.2010. до 2.1.2011. године у Републици Србији бележи се 3236 случајева обољења сличних грипу са инциденцијом од 44,03.
- Инциденција је испод прага за епидемијски период.
- Највиша узрасно специфична стопа од 238,05 бележи се у узрасној групи од 0 до 4 године.

Лабораторијски надзор:

- Током ове извештајне недеље послата су два несентинелна и два сентинелна узорка, од којих је један узорак АРДС-а, у Референтну лабораторију за респираторне вирусе Института за вирусологију, вакцине и серуме Торлак и сви су негативни на вирусе инфлуенце.

**Инфлуенца активност у Европи
(подаци са Euroflu – електронског недељног билтена):**

- Овај извештај је заснован на подацима добијеним од 39 од укупно 53 чланице у Европском региону Светске здравствене организације, СЗО.
- Ниво активности грипа показује растући тренд, нарочито у земљама западне Европе.
- 45 % сентинелних узорака било је позитивно на вирус инфлуенце.
- У Европском региону се у циркулацији налазе вирус инфлуенце Б, вирус инфлуенце А (H3N2) и пандемијски вирус А (H1N1) 2009.

- У Шкотској се региструје повећан број случајева САРИ, као и повећан број случајева САРИ изазваног вирусом пандемијске инфлуенце А (H1N1) 2009.

Инциденција обољења сличних грипу на 100.000 становника по узрасту у 52. извештајној недељи у Републици Србији

Узраст/ Извештајна недеља	0–4	5–14	15–29	30–64	65+
52	238,05	91,36	35,70	22,84	27,64

Квалитативни показатељи за 52. недељу у Републици Србији

Недеља	Географска раширеност	Интензитет	Тренд инциденције	Степен оптерећења здравствене заштите
52	нема активности	низак	опадајући	низак

Додатак:

- Baseline influenza активност тј. праг за епидемијски период је ниво клиничке инфлуенца активности који остаје током лета и већином током зиме. Дефинисани праг за Републику Србију је инциденција 112/100.000.
- Обично је то период од шест до 12 недеља током зиме када је ниво клиничке активности инфлуенце изнад baseline линије.